



**Курение – одна из самых распространенных вредных привычек среди населения**

Средний возраст курильщика составляет **17 лет**, а средняя продолжительность жизни 72,5 лет

Эта пагубная привычка отнимает у нас от 10 до 15 лет жизни. Откажитесь от курения!

**8-800-200-0-200**

**ГЦМП**

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР  
МЕДИЦИНСКОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ

18+

# Осторожно, электронные сигареты!

Вейпы вызывают никотиновую зависимость большую, чем табачные изделия. В электронных сигаретах нагревается жидкость, и курильщик вдыхает не дым, а пар


**«Двойные курильщики»**  
- курильщики, которые  
не могут или не хотят  
отказаться от курения и  
дополнительно  
прибегают к курению  
вейпов



# Безопасны ли вейпы? НЕТ!

ГЦМП  
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР  
МЕДИЦИНСКОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ

- Их аэрозоли содержат высокотоксичный никотин и другие химические токсины и канцерогены
- Состав жидкостей для вейпов не регулируется никакими стандартами, кроме предельного уровня содержания никотина в курительных жидкостях
- Содержащийся в жидкости для заправки вейпов сульфат никотина – мощный нейротоксин, способный вызвать тяжелые отравления, ранее использовался для травления насекомых



**«Лёгкие» и электронные сигареты не  
уменьшают вред от курения.  
Откажитесь от курения полностью!**

**В 90% случаев причина и источник пассивного курения – родители!  
Более половины детей подвергаются воздействию табачного дыма дома или в автомобиле!**

Каждая выкуренная сигарета во  
время беременности вредит  
здоровью будущего малыша!  
Пассивное курение матери  
также **наносит ущерб** развитию  
и здоровью ребенка

**Курящий папа – угроза**  
не только собственному  
здравию, но и для  
здравья будущей мамы  
и будущего малыша

Привычка курить, способна приводить к развитию **12 форм онкологических заболеваний**, это не только поражения легких, горлани и ротовой полости, но и другие виды рака. Онкологию желательно обнаружить на ранней стадии – курильщикам особенно важно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры



Курение при артериальной гипертензии повышает **в 7–8 раз риск осложнений** заболевания! Никотин обладает свойством усиливать спазм сосудов, которые и без того страдают при повышении артериального давления. Выкуренная сигарета может вызвать подъем артериального давления более чем **на 30 мм рт. ст. уже через 5 минут после курения**



**Если Вы курите - вероятность развития онкологических патологий увеличивается под влиянием следующих факторов:**

- ранний возраст начала курения
- продолжительный стаж курения
- суточная доза сигарет – 20 шт. и более
- злоупотребление спиртными напитками

*Вероятность развития рака лёгких у лиц, выкуривающих 40 сигарет и более в день, примерно в 20 раз выше, чем у некурящих*

**8-800-200-0-200**

**Откажитесь от курения!**

**18+**